



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز مرکز آموزشی و درمانی سردار سپهر شهید حاج قاسم سلیمانی



مرکز آموزشی و درمانی

سردار سپهر شهید حاج قاسم سلیمانی

بازسازی و درمان عروق خونی (اسکلروتراپی)

تهیه کننده: واحد آموزش سلامت

تایید کننده: کمیته آموزش بیمار

تاریخ تهیه: ۱۴۰۴

شماره واحد آموزش به بیمار: ۰۲۶۳۵۷۷۱۱۲۵

منابع: ClinicalKey, WebMD, Mayo clinic


اسکلروتراپی چیست؟

• مری لوله ای عضلانی است که دهان را به معده متصل کرده است. در بیماران با بیماری کبدی، ممکن است عروق در مری متسع شوند و این عروق ممکن است پاره شده و خونریزی دهد.

• اسکلروتراپی شامل تزریق یک دارو در این وریدهای متسع است که تولید "اسکار" کرده و باعث ضخیم شدن عروق خونی میشود. این ضخامت به جلوگیری از جریان خون در رگ کمک می کند، به طوری که آن ها دیگر خونریزی نمی کنند.


قبل از عمل:

• شما باید از خوردن و نوشیدن هر چیزی بعد از نیمه شب قبل از اسکلروتراپی پرهیز کنید.



در این روش:

- پرستار شما (IV) خط وریدی در یک ورید در دست شما برقرار خواهد کرد. از طریق IV به شما داروهایی که قبل و در طی عمل لازم است، می دهند.
- دکتر شما یک لوله انعطاف پذیر، به نام آندوسکوپ را از طریق دهان به مری عبور میدهد. Endoscope در مقایسه با مری کوچک است و برای تنفس شما مشکل ایجاد نخواهد شد. یک لامپ در انتهای آندوسکوپ است که به دکتر اجازه بررسی مری، معده، و اثنی عشر (نزدیک ترین بخش از روده کوچک به معده) برای علل دیگر خونریزی را می دهد. دکتر شما یک لوله کوچک تر از طریق آندوسکوپی وارد می کند. لوله ها کوچک تر از یک سوزن برای تزریق در رگ است به طوری که آنها زخمی و ضخیم می شوند.



پس از عمل :

- پس از اسکروتراپی، بعد از بازگشت رفلکس بلع شما مجاز به خوردن و نوشیدن هر چیزی هستید.
- پرستار شما ممکن است رفلکس بلع را با نوازش پشت گلو با یک سواب پنبه تست کند.
- هنگامی که این Swabbing تولید احساس عق زدن در شما کرد، شما می توانید مایعات بنوشید. شما احتمالاً رژیم غذایی عادی خود را از روز بعد از سر خواهید گرفت.
- پرستار شما فشار خون، درجه حرارت، نبض و تنفس شما را اغلب در چند ساعت اول پس از اسکروتراپی چک خواهد کرد.
- اگر شما یک بیمار سرپایی هستید، احتمالاً اجازه خواهید داشت یک ساعت یا دو پس از عمل به خانه بازگردید.
- گلو درد بعد از اسکروتراپی طبیعی است. بعضی از بیماران درد خفیف قفسه سینه، بلع دردناک، درد گاز و آروغ زدن را تجربه می کنند. این شرایط معمولاً خود به خود رفع میشود. گاهی اوقات، یک بیمار مبتلا به خونریزی یا تب پس از عمل می شود.

- با دکتر خود تماس بگیرید و اگر سرفه خونی و یا تب دارید به بخش اورژانس مراجعه کنید. اگر شما هر گونه سوال یا نگرانی مربوط به دارید با دکتر خود تماس بگیرید.
- اسکروتراپی معمولاً نیاز به تکرار درمان دارد. دکتر شما به شما خواهد گفت که چگونه اغلب باید تکرار شود.

