



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز مرکز آموزشی و درمانی سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی



مرکز آموزشی و درمانی

سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

آسیب جداره روده نوزاد

تهیه کننده: واحد آموزش سلامت

تایید کننده: کمیته آموزش بیمار

تاریخ تهیه: ۱۴۰۴

شماره واحد آموزش به بیمار: ۰۲۶۳۵۷۷۱۱۲۵

منابع: ClinicalKey, WebMD, Mayo clinic

شرح بیماری:

- آنتروکولیت نکرولوزان یکی از شایع ترین اورژانس های جراحی-پزشکی دستگاه گوارش در نوزادان است.
- اگرچه این بیماری بیشتر در نوزادان نارس رخ می دهد ولی احتمال ایجاد آن در نوزادان رسیده نیز وجود دارد.
- آنتروکولیت نکرولوزان بیشتر قسمت انتهایی روده باریک و ابتدایی روده بزرگ را درگیر می کند ولی می تواند هر قسمتی از هر دو روده را درگیر کند. در موارد شدید بیماری می تواند سایر اعضای بدن را تحت تأثیر قرار دهد. این بیماری در هفته های دوم تا سوم زندگی نوزاد نارس رخ می دهد.

علائم:

- عدم تحمل غذا، تهوع و استفراغ
- تأخیر در تخلیه معده و افزایش حجم معده
- اسهال آبکی و گاهی خونی همراه با انقباضات، اتساع و سفتی شکمی
- تب و لرز و بالا بودن تعداد گلبول های سفید در آزمایش خون
- افت فشار خون گاهی تا حد شوک همراه با نبض های ضعیف و ضربان قلب سریع
- کاهش صداهای شکمی
- قرمزی جداره شکم
- دفع خون از روده ها
- علائم غیر اختصاصی مانند قطع تنفس.

علل و عوامل خطر:

- عفونت باکتریایی

- هایپوکسمی یا کمبود اکسیژن خون
- عقب ماندگی رشد داخل رحمی
- نارس بودن نوزاد و کم وزن بودن نوزاد
- بیماری های قلبی مادر زادی

عوارض احتمالی:

- پارگی روده و ایجاد پریتونیت یا عفونت پرده شکم
- التهاب صفاقی و سوراخ شدگی آن
- شوک و از دست دادن شدید مایعات بدن و مرگ

تشخیص:

- معاینه توسط پزشک و بررسی علائم و نشانه ها
- رادیوگرافی شکم
- سونوگرافی

درمان:

- در تمامی موارد بروز این بیماری نیاز است که بیمار بستری شود.
- 70 درصد نوزادان مبتلا نیاز به جراحی و برداشتن روده مبتلا خواهند داشت.

درچه شرایطی به پزشک مراجعه نمایید؟

- در صورت مشاهده علائم بیماری مانند اتساع شکم، تهوع و استفراغ و ... در نوزاد سریعاً به پزشک مراجعه کنید.
- اگر علائم پس از درمان و جراحی مجدد مشاهده شد به پزشک مراجعه کنید.
- در صورت مشاهده عوارض بعد از عمل جراحی مانند تب و ترشحات بدبو از محل عمل.