




دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز مرکز آموزشی و درمانی سردار سپهر شهید حاج قاسم سلیمانی



مرکز آموزشی و درمانی

سردار سپهر شهید حاج قاسم سلیمانی

آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی

تهیه کننده: واحد آموزش سلامت

تایید کننده: کمیته آموزش بیمار

تاریخ تهیه: ۱۴۰۴

شماره واحد آموزش به بیمار: ۰۲۶۳۵۷۷۱۱۲۵

منابع: ClinicalKey, WebMD, Mayo clinic

شرح روش:

این آزمون به پزشک اجازه می‌دهد بتواند داخل مری، معده و اثنی عشر را نگاه کند. مری لوله انتقال مواد غذایی است که از دهان به داخل معده منتهی شده است. اثنی عشر قسمت ابتدایی روده کوچک است. این آزمون می‌تواند شرایط غیرعادی مثل زخم و التهاب را نشان دهد. در طول آزمون، نمونه‌های بافتی کوچک ممکن است گرفته شود. این روش نیز می‌تواند برای گشاد و یا باز کردن مری و معده تنگ مورد استفاده قرار گیرد. این روش ممکن است برای حذف پولیپ‌ها و اشیاء بلعیده و یا برای درمان خون‌ریزی رگ‌ها و زخم به کار رود.

دلایل انجام:

این یک روش تشخیصی است و برای کمک به تشخیص بیماری‌های دستگاه گوارش فوقانی و همچنین کمک به انتخاب بهترین روش درمان برای بیماری‌های این قسمت انجام می‌شود.

عوارض احتمالی:

خون‌ریزی و عفونت در دستگاه گوارش فوقانی از عوارض این روش تشخیصی هستند که در نتیجه وارد کردن آندوسکوپ از راه دهان بروز می‌یابند.

اقدامات قبل از عمل:

اگر شما در حال مصرف هر یک از داروهای زیر هستید، لطفاً با پزشک خود و یا مرکز آزمون برای دستورالعمل‌های لازم هماهنگ شوید:

آسپرین و داروهای ضد انعقادی

داروهای ضد التهابی غیراستروئیدی (آسپرین و یا داروهای آرتريت)

دیابتی (انسولین و...)

داروهای قلب

آنتی‌اسیدها

در صورتی که به بیماری‌هایی مثل هپاتیت یا ایدز مبتلا هستید، حتماً پیش از انجام آندوسکوپی این موارد را به پزشک اطلاع دهید.

از نیمه شب قبل از آزمایش از خوردن و نوشیدن پرهیز کنید.

اگر پزشک یا آزمایشگاه به شما گفته است داروی معمول خود را مصرف کنید، آن را فقط با جرعه‌های کوچک آب میل کنید.

با توجه به اینکه از آرام‌بخش استفاده می‌شود حضور همراه جهت انتقال به منزل ضروری است.

نسخه پذیرش از پزشک، فرم‌های بیمه و یا معرفی‌نامه‌ها

فهرستی از مواد غذایی یا داروهایی که به آن‌ها آلرژی دارید را به همراه بیاورید.

از شما خواسته خواهد شد تا فرم رضایت‌نامه را امضا کنید.

شما لباس بیمارستان خواهید پوشید و خواسته می‌شود که دندان مصنوعی، لنزهای تماسی یا عینک و جواهرات خود را خارج کنید.

در صورت نیاز کاتتر داخل وریدی (IV) در بازوی شما قرار می‌گیرد.

شما دارو جهت بی‌حس کردن گلو خود را دریافت خواهید کرد.

روش انجام:

- برای انجام آندوسکوپی آرامش خود را حفظ و به سمت چپ دراز بکشید.
- به گلوئی شما یک اسپری بی حس کننده زده می شود تا چیزی احساس نکنید.
- ممکن است یک قطعه کوچک محافظ در بین دندان های شما قرار داده شود. این کار باعث می شود که دندان های شما آسیب نبینند.
- وقتی شما آماده بودید، پزشک سر آندوسکوپ را روی زبان شما قرار داده و آن را به طرف گلو می برد و از شما می خواهد که آن را قورت دهید و سپس به سمت پایین معده می رود.
- یک پرستار دائماً مراقب شما خواهد بود و با یک ساکشن بزاق شما را که در داخل دهانتان جمع شده ساکشن می کند.
- گاهی پزشک اقدام به نمونه برداری از بافت معده (بیوپسی) می کند که درد ندارد.
- در طی آندوسکوپی ممکن است احساس فشار در گلو و ناراحتی در شکم و زدن آروغ (به خاطر هوایی که داخل معده جهت مشاهده دقیق فرستاده می شود) شوید که این واکنش ها طبیعی است.



اقدامات بعد از عمل:

- لازم است یک ساعت پس از آندوسکوپی در بیمارستان و یا محل آندوسکوپی تحت نظر باشید.
- پرستار فشارخون و ضربان قلب شما را به طور مکرر چک می کند.
- پرستار شما هم چنین حالت تهوع شما را کنترل می کند.
- از خوردن و نوشیدن تا زمانی که حالت تهوع دارید، پرهیز کنید.
- ممکن است پس از تست احساس بی حسی، درد در گلو و احساس کسل بودن کنید.

در چه شرایطی به پزشک مراجعه نمایید؟

- درد شدید و یا مداوم شکم
- مدفوع سیاه یا سفید و خون ریزی
- تهوع و استفراغ
- تب شدید