




دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز مرکز آموزشی و درمانی سردار سپهر شهید حاج قاسم سلیمانی



مرکز آموزشی و درمانی

سردار سپهر شهید حاج قاسم سلیمانی

التهاب دیواره سیاهرگ

(ترومبوفلیت)

تهیه کننده: واحد آموزش سلامت

تایید کننده: کمیته آموزش بیمار

تاریخ تهیه: ۱۴۰۴

شماره واحد آموزش به بیمار: ۰۲۶۳۵۷۷۱۱۲۵

منابع: ClinicalKey, WebMD, Mayo clinic

شرح بیماری:

ترومبوفلیت عبارت است از التهاب و وجود لخته های خون در یک ورید یا سیاهرگ (معمولاً اندام های تحتانی) که به طور اولیه ناشی از عفونت یا آسیب است. ترومبوفلیت به دو صورت بروز می کند: 1- ترومبوفلیت سطحی 2- ترومبوفلیت عمقی.

ترومبوفلیت در وریدهای پا ایجاد می شود و ندرتاً ممکن است در وریدهای بازو یا گردن ایجاد شود. ترومبوفلیت های سطحی در وریدهایی ایجاد می شوند که تنها در زیر پوست قابل رویت هستند. ترومبوز وریدهای عمقی یا بسیار خطرناک تر از ترومبوفلیت های سطحی است. افراد نمی توانند ترومبوفلیت عمقی را ببینند یا آن را احساس کنند.

آسیب به غشای پوشاننده ورید در اثر ضربه

تزریق داخل وریدی

گسترش یک سرطان خونی بدخیم

بی تحرکی بعد از جراحی

اقامت طولانی در بستر یا نشستن طولانی

مصرف سیگار

چاقی

وریدهای واریسی

سوختگی

عفونت

بارداری و یا زایمان

اختلالات عروق خونی

قرص های ضدبارداری خوراکی یا درمان با استروژن

سکته و یا سایر بیماری هایی که سبب بی تحرکی می شوند
وجود اختلالات انعقادی در تاریخچه خانوادگی
وجود کتتر یا لوله در ورید مرکزی برای تزریق دارو یا دیالیز
علائم و نشانه ها شایع:

طنابی شدن وریدهای سطحی ناحیه مبتلا

قرمزی ناحیه

حساسیت به لمس

درد در ناحیه مبتلا

گاهی اوقات تب

عوارض احتمالی:

ممکن است منجر به ترومبوز وریدی عمقی (لخته در وریدهای عمقی) گردد.

آمبولی ریه که نوعی بیماری کشنده است، نتیجه ترومبوز وریدهای عمقی است که به دنبال تشکیل لخته در عروق و حرکت آن به طرف ریه ها ایجاد می شود. این لخته خونی سبب مسدود شدن جریان خون ریوی شده اکسیژن رسانی به بافت های بدن کاهش پیدا می کند.

اگر عفونتی در بدن وجود داشته باشد و درمان نشود، می تواند منجر به مسمومیت خون شود.

تشخیص:


تشخیص توسط پزشک با اخذ شرح حال و معاینه دقیق بیمار صورت می پذیرد. در صورت نیاز از دیگر روش های تشخیصی از جمله موارد زیر استفاده می شود:

سی تی اسکن

ام آر آی برای مشاهده عروق خونی



- اگر در طول درمان موارد زیر رخ دهند:
- تب 9/38 درجه سانتیگراد یا بالاتر، درد غیرقابل تحمل
- سرفه خونی، تنگی نفس، درد قفسه سینه، تورم ساق یا پا
- اگر دچار علائم جدید و غیرقابل توجه شده‌اید.
- اگر در زمان درمان با داروها عوارض جانبی ایجاد شود.



- افزایش مصرف انواع توت ها، شاه توت، گیلان و زغال اخته، که حاوی مواد شیمیایی - پروآنتوسیانیدین و آنتوسیانین - که منجر به بهبود عملکرد رگ می شود.
- افزایش مصرف زنجبیل، سیر، پیاز و فلفل که مانع از تشکیل لخته به علت خواص رقیق کننده خون است.
- افزایش مصرف فولیک اسید، ویتامین ب۶، ب۱۲، ث، ای و ب کمپلکس منجر به افزایش عملکرد رگ ها می شود.



فعالیت:

- استراحت در بستر به همراه بالا بردن اندام آسیب دیده ممکن است به مدت 1-2 روز مؤثر باشد.
- در بیشتر اوقات، پاها، مچ پاها و ساقها را حرکت دهید. وقتی التهاب شروع به فروکش کردن کند، به آهستگی فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری طبیعی را از سر بگیرید در بیشتر مواقع استراحت کنید. به مدت طولانی ننشینید و نایستید و پاها را روی هم نگذارید.

در چه شرایطی به پزشک مراجعه نمایید؟

- اگر شما یا یکی از اعضای خانواده تان علائم ترومبوفلیت سطحی را داشته باشید .

- آزمایش خون
- ونوگرافی (استفاده از تزریق ماده حاجب برای مشاهده رگها)
- ♦ **درمان:**
- درمان معمولاً شامل استراحت و بالا بردن پاها
- استفاده از کمپرس آب گرم روی محل
- درمان های دارویی از جمله آسپرین برای کاهش درد و التهاب. البته افرادی که از وارفارین استفاده می کنند، قبل از مصرف آسپرین حتماً باید با پزشک خود مشورت کنند زیرا آسپرین خود رقیق کننده خون می باشد.
- پوشیدن جوراب های کشی یا استفاده از بانداژ کشی
- آنتی بیوتیک ها در صورت شك به عفونت باکتریایی
- استفاده از پمادهای موضعی در صورت وجود خارش
- استفاده از درمان ضد انعقاد (رقیق کننده های خون) مانند هپارین تزریقی و یا وارفارین خوراکی به مدت طولانی.

رژیم غذایی:

- در صورت مصرف وارفارین (رقیق کننده خون) مواد غذایی حاوی ویتامین ک مانند سبزیجات با برگ های سبز تیره و روغن کانولا را با احتیاط و با مشورت پزشک خود مصرف کنید.
- از یک رژیم غذایی کم چرب پیروی کنید. چربی منجر به اختلال جریان طبیعی گردش خون شده و احتمال ایجاد لخته های خونی را افزایش می دهد.
- از یک رژیم غذایی پر فیبر شامل سبزیجات، میوه جات، ماهی، آجیل و غلات استفاده کنید.