



شرح بیماری

کتواسیدوز دیابتی ((DKA از مشکلات جدی و مهم در افراد مبتلا به دیابت نوع یک است و زمانی رخ می‌دهد که ماده شیمیایی به نام کتون در خون ساخته می‌شود. به طور طبیعی بدن قند را به عنوان منبع انرژی می‌شکند. انسولین موجود در خون موجب می‌شود که قند خون به سلول‌ها وارد و به عنوان منبع انرژی مورد استفاده قرار گیرد. اما در افراد دیابتی با قند کنترل نشده، بدن قادر به استفاده از قند خون نیست. در نتیجه بدن، چربی را به عنوان منبع انرژی می‌سوزاند. اما سوزاندن چربی باعث می‌شود بدن مقدار زیادی کتون درست کند. این کتون سمی و برای بدن خطرناک می‌باشد.

علائم

- احساس تشنگی و نوشیدن زیاد یا پرنوشی
- افزایش ادرار یا پرادراری
- تهوع استفراغ
- درد شکم
- بی‌اشتهایی و کاهش وزن
- احساس خستگی و ضعف یا عدم تمرکز و خواب‌آلودگی که ممکن است در موارد شدید منجر به کما شود.
- تنفس با بوی میوه گندیده یا استون
- افزایش تعداد تنفس و تنگی نفس
- کاهش دمای بدن، کاهش فشار خون و افزایش ضربان قلب
- در مراحل پیشرفته تر ممکن است هوشیاری کاهش یابد.

علل شایع

- تزریق نادرست انسولین و یا خرابی و درست کار نکردن پمپ انسولین
- عدم آگاهی از بیماری دیابت و یا عدم تحمل درمان.
- عفونت در هر قسمت بدن
- سکته مغزی یا قلبی
- مصرف برخی داروها، کوکائین
- حاملگی و استرس یا فشارهای روحی
- تصادف یا جراحی

عوارض احتمالی

در صورت عدم درمان سریع، بیمار به سمت تغییر وضعیت ذهنی یا کوما و نهایتاً مرگ سوق پیدا می‌کند.



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز
مرکز آموزشی و درمانی سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی



مرکز آموزشی و درمانی

سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

دیابت کتواسیدوزیس

تهیه کننده: واحد آموزش سلامت

تایید کننده: کمیته آموزش بیمار

تاریخ تهیه: ۱۴۰۴

شماره واحد آموزش به بیمار: ۰۲۶۳۵۷۷۱۱۲۵

منابع: ClinicalKey, WebMD, Mayo clinic

پیشگیری

- کنترل مرتب قند خون خصوصاً در زمانی که مبتلا به عفونت و... هستید. ممکن است لازم باشد هر 3 تا 4 ساعت میزان قند خون بررسی و کنترل شود.
- استفاده دقیق از انسولین حتی در زمانی که غذا نخورده‌اید و مشورت با پزشک در شرایط خاص و تغییر دوز انسولین با نظر پزشک



- مصرف کافی مایعات
- آموزش بیمار در زمینه علائم کتواسیدوز دیابتی و مراجعه به پزشک در صورت مشاهده علائم

تشخیص

- معاینه توسط پزشک
- آزمایش قند خون و سطح کتون ادرار
- نوار قلب

درمان

- بستری در بیمارستان و جایگزین کردن مایعات از دست رفته و الکترولیت‌هایی مانند سدیم و پتاسیم که موجب تنظیم کارکرد سلول می‌شود از طریق داخل وریدی
- تزریق انسولین
- شروع مصرف آنتی بیوتیک در صورت وجود عفونت

در چه شرایطی به پزشک مراجعه نمایید؟

- در صورتی که قند خون دوبار در طی فاصله زمانی 3 یا 4 ساعت بالاتر از 300 میلی گرم بر دسی لیتر باشد.
- در صورت بالا رفتن میزان کتون ادرار در تست‌های خانگی
- اگر مبتلا به دیابت بوده و علائم عفونت مانند تب و گلو درد و... داشتید.
- در صورت مشاهده علائم کمبود مایعات بدن مانند خشکی مخاط و تشنگی و پرادراری و...