




دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز مرکز آموزشی و درمانی سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی



مرکز آموزشی و درمانی سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

کم رسیدن خون به قلب

تهیه کننده: واحد آموزش سلامت

تایید کننده: کمیته آموزش بیمار

تاریخ تهیه: ۱۴۰۴

شماره واحد آموزش به بیمار: ۰۲۶۳۵۷۷۱۱۲۵

منابع: ClinicalKey, WebMD, Mayo clinic

علائم:

- در زمان ابتلا به بیماری ایسکمی قلبی بسته به شدت بیماری علائم زیر بروز می نماید:
- درد قفسه سینه که به طور ناگهانی ظاهر می شود.
- بیش از ۲۰ دقیقه طول می کشد و در ناحیه پشت جناغ سینه یا سمت چپ قفسه سینه یا درگلو یا فک تحتانی یا پشت قفسه سینه یا شانه چپ وجود دارد و علیرغم استراحت و مصرف دارو تداوم می یابد.

• کوتاهی نفس

• سوزش

• تهوع و اضطراب

• پوست بیمار ممکن است سرد، رنگ پریده و مرطوب باشد.

• تعداد تنفس و ضربان قلب سریعتر از حالت طبیعی است.

تشخیص:

• پزشک معالج جهت تشخیص بیماری اقدامات زیر را انجام می دهد:

• تاریخچه بیمار (توصیف علائم موجود، بیماری قبلی، سلامت خانوادگی بخصوص بیماری قلبی).

• نوار قلب در ۱۰ دقیقه اول شروع درد یا بلافاصله پس از رسیدن بیمار به اورژانس

• اکوکاردیوگرافی برای ارزیابی عملکرد بطنی

• آزمایش خون

• اسکن قلب

• آنژیوگرافی (عکسبرداری از رگ ها با اشعه ایکس به کمک تزریق ماده حاجب درون آن ها)

عوارض:

• به دنبال ایسکمی قلبی با توجه به شدت بیماری ایجاد شده در شما عوارض زیر ممکن است ایجاد شود:

• ادم حاد ریوی

• نارسایی احتقانی قلبی

• شوک قلبی

• حمله قلبی


• بی نظمی های ضربان قلب و ایست قلبی

درمان:

• پزشک معالج شما جهت درمان اهداف درمانی زیر را دنبال می نماید،

• اهداف درمان عبارتست از:

• کاهش آسیب میوکارد یا عضله قلب



♦ در چه شرایطی به پزشک مراجعه نمایید؟

- درد قفسه صدري، علي‌رغم استراحت و درمان با نیتروگلیسرین که بیش از 15-10 دقیقه طول بکشد.
- با درد قفسه صدري از خواب بلند شوید و درد با يك قرص نیتروگلیسرین برطرف نشود.
- حمله درد قفسه صدري متفاوت با گذشته یا شدیدتر از حد معمول است.

- برقراری مجدد جریان خون کرونری از طریق تجویز اورژانسی داروهای حل‌کننده لخته یا انجام بالون
- کاهش نیاز میوکارد به اکسیژن و افزایش عرضه اکسیژن از طریق تجویز داروها، اکسیژن و استراحت در بستر.
- جراحی پیوند عروق قلب، در زمان‌هایی که سرخرگ‌های قلبی شدیداً مسدود شده‌اند.

♦ دارو:

- پزشک معالج جهت درمان دارویی بیمار از دسته داروهای زیر استفاده می‌کند.
- نیترات‌ها (نیتروگلیسرین) جهت گشاد کردن عروق قلب و افزایش عرضه اکسیژن به عضله قلب
- داروهای ضد انعقادی مانند آسپیرین و هپارین
- داروهای حل‌کننده لخته که باید طی ۶-۳ ساعت اول بروز نشانه‌ها تجویز شوند.
- تجویز مسکن‌ها (مورفین)
- بتا بلوکرها

