



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز

مرکز آموزشی درمانی سردار سپهر شهید حاج قاسم سلیمانی

تریاز در بلایا و حوادث با مصدومین انبوه

START: Simple Triage And Rapid Treatment در بزرگسالان و Jump start در کودکان: تریاز آسان و انتقال سریع، مدت زمان

ارزیابی هر مصدوم کمتر از ۶۰ ثانیه و ترجیحا زیر ۳۰ ثانیه

بیماران بر اساس ۴ معیار تریاز یا اولویت بندی می شوند: توانایی راه رفتن، وضعیت تنفسی، وضعیت خونسازی، وضعیت هوشیاری

رنگ	گروه	توضیحات	اولویت
قرمز	مراقبت فوری و انتقال ضروری	بیماران اورژانسی که ضایعات مخاطره آمیز داشته و بدون اقدام درمانی سریع در کمتر از ۱-۲ ساعت جان خود را از دست می دهند یا دچار عوارض شدید و یا ماندگار میشوند	اولویت ۱
زرد	مراقبت اورژانسی تأخیری و انتقال	مصدومینی که با اینکه جراحات داشته و نیاز به مداخله درمانی و بستری شدن دارند اما بدون درمان احتمالا بیش از ۲ ساعت دوام خواهند آورد و احتمالا دچار عوارض ماندگار نخواهند شد	اولویت ۲
سبز	آسیبهای خفیف و بیماران سرپایی	شامل افرادی می باشند که احتمالا نه جانشان به خطر می افتد و نه دچار عوارض ناشی از آسیب میشوند و نیاز به درمان اورژانسی ندارند. این گروه شامل افرادی است که قادر به راه رفتن می باشند.	اولویت ۳
سیاه	آسیبهای منجر به مرگ یا کشنده	موارد فوت شده و یا بیماران در حال مرگ که ضایعات بسیاری شدیدی داشته و شانسی بسیار کم، یا هیچ بقا دارند	اولویت ۴

روش ساده یادگیری پروتکل START در بزرگسالان :

ابتدا مسئول تریاز می گوید کلیه کسانی که قادر به راه رفتن هستند از محل حادثه دور شوند :گروه سبز

بعد از جدا کردن مصدومین گروه سبز :

مصدومین فاقد تنفس خود بخود علی رغم مانور، نفس ندارند :گروه سیاه

مصدومین با تنفس کمتر از ۳۰ در دقیقه و نبض رادیال قابل لمس و تبعیت از دستورات :گروه زرد

سایر مصدومین : گروه قرمز

تنها اقدام درمانی در اجرای پروتکل START در بزرگسالان مانور JAW TRUST و فشار مستقیم بر محل خونریزی خارجی فعال است.

تفاوت تریاز کودکان و بزرگسالان :

۱- فاقد تنفس خود بخود است باز کردن راه هوایی برقرار نشد: کنترل نبض - نبض نداشت: کارت سیاه نبض داشت: ۵ تنفس مصنوعی به او

بدهید اگر تنفس برقرار شد :کارت قرمز اگر تنفس برقرار نشد: کارت سیاه 2

۲- در شمارش تعداد تنفس ۱۵ تا ۴۵ تنفس در دقیقه ملاک طبیعی است.

۳- نبض براکیال یا هر نبض قابل لمس مورد استفاده قرار بگیرد. 4

۴- تبعیت از دستورات ملاکی برای وضعیت عصبی کاربردی ندارد و از معیار AVPU (A: هوشیار-V: پاسخ به تحریکات کلامی-P: پاسخ به

تحریکات دردناک-U: بدون پاسخ) استفاده می شود.



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز
مرکز آموزشی درمانی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

